

Guía de cuidados posteriores para dueños de mascotas

Si bien la esterilización es una de las cirugías veterinarias más comunes, la recuperación requiere cuidados y supervisión posoperatoria. Utilice esta guía para comprender el proceso, cómo brindar la mejor atención posoperatoria y cuándo podría necesitar contactar a su veterinario.

¿Por Qué Castrar a tu Perro?

La esterilización de un perro macho ofrece varios beneficios, como prevenir camadas no deseadas, reducir el riesgo de ciertos problemas de salud como el cáncer testicular y los problemas de próstata, y potencialmente frenar ciertos comportamientos indeseables. También contribuye a controlar la población canina general, reduciendo el número de animales sin hogar.

El Día Antes de la Cirugía...

Su veterinario le dará algunas instrucciones, que pueden incluir:

- No alimente a su perro después de la medianoche.
- Ofrézcale a su perro una pequeña cantidad de agua.

¿Qué Necesitaré?

Utilice esta lista de artículos y productos para facilitar la recuperación de su perro:

- Un cono de recuperación para evitar que se lama y muerda la zona quirúrgica.
- Una jaula, una cama suave para perros y mantas para proporcionar un lugar cómodo donde descansar.
- Analgésicos (suministrados por su veterinario).
- Juguetes para perros para mantener a su mascota estimulada durante la recuperación (juguetes interactivos como rompecabezas y KONGs de peluche funcionan bien).
- Calmantes, como suplementos como Nutramax, según lo recomendado por su veterinario.
- Comedores y bebederos.

Administre a su perro todos los medicamentos recetados según las indicaciones de su veterinario.

Si cree que su perro tiene dolor, o si muerde o intenta lamer la incisión, contacte con su veterinario inmediatamente. No le dé a su perro ningún analgésico para humanos ni de venta libre sin la aprobación de su veterinario.

Día de la Cirugía...

Esto es lo que puede esperar:

- Llegue al hospital temprano por la mañana.
- Despues de completar toda la documentación, su mascota será hospitalizada, se le extraerá sangre y se le colocará un catéter intravenoso.
- Su veterinario realizará un examen exhaustivo y revisará el historial médico y los análisis de sangre de su cachorro.
- Su veterinario creará un plan anestésico adecuado para su perro.
- A su mascota se le administrarán analgésicos y sedantes para ayudar con la anestesia general, que se utiliza para mantener a su mascota inconsciente y sin dolor durante la cirugía.
- Se le colocará un tubo de respiración para ayudar a su mascota durante la cirugía, y se le afeitará y se le preparará de forma estéril. ¡No se alarme si a su perro le quitan mucho pelo!
- En algunos casos, el testículo de un perro no desciende (criptorquidia) y permanece en el abdomen. Si esto ocurre, su veterinario deberá encontrarlo y extirarlo durante la cirugía, ya que un testículo no descendido puede aumentar el riesgo de cáncer de una mascota si no se extirpa.

¿Qué Debo Esperar Cuando Mi Perro Llegue a Casa?

Debido a que su perro estuvo bajo anestesia, es posible que aún esté aturdido después de salir del hospital; esto debería desaparecer en 24 horas. Se recomienda no dejar a su perro sin supervisión durante 24 a 48 horas después de la cirugía.

Es probable que su veterinario envíe a su perro a casa con medicamentos para reducir el dolor y la inflamación.

Los perros suelen recuperarse rápidamente después de la esterilización, pero brindarles alivio del dolor y comodidad puede ayudar en el proceso de curación.

La primera noche en casa, ofrézcale a su perro:

- Un poco de agua (aproximadamente la mitad de su cantidad habitual).
- Un poco de comida (aproximadamente un cuarto o la mitad de su cantidad habitual).

Nota: Sea constante al limitar la comida de su perro después de su primera comida, ya que los cambios repentinos pueden provocar molestias gastrointestinales. Evite agregar suplementos a su comida u ofrecerle comida para humanos.



Preguntas Frecuentes

petMD
by chewy

¿Cómo puedo ayudar a mi perro?

Asegúrese de seguir atentamente las instrucciones postoperatorias de su veterinario; es importante asegurarse de que su mascota se recupere por completo. Las instrucciones suelen incluir:

- Un período de confinamiento de dos semanas con ejercicio limitado, sin saltar, correr ni jugar bruscamente con otros.
- Si su perro es activo, estos comportamientos pueden provocar la apertura de la incisión, sangrado, infección o hematomas, y su mascota podría necesitar más tratamiento.
- Es posible que deba separar a su perro de las demás mascotas de la casa.
- No bañe a su perro durante este tiempo y no permita que la zona quirúrgica se moje.

¿Cuánto tiempo tardará en sanar mi perro?

Normalmente, el período de recuperación de un perro después de una esterilización es de 10 a 14 días.

Es normal que aparezcan algunos moretones alrededor de la zona quirúrgica, pero si nota moretones excesivos, hinchazón o supuración en la incisión, consulte a su veterinario.

Su perro podría tener un pequeño vendaje en la pata delantera donde se colocó el catéter intravenoso. Este vendaje generalmente se puede retirar unas horas después de que regrese a casa.

¿Debo limpiar la zona quirúrgica de mi perro?

Solo debería ser necesario supervisar la incisión de su perro una vez al día y mantener la zona seca.

Normalmente no es necesario limpiar la herida. No aplique ningún ungüento, aerosol ni pomada tópica sin consultar primero con su veterinario.

Los puntos externos rara vez se utilizan; sin embargo, si hay puntos, suelen retirarse en dos semanas.

Cuándo llamar a su veterinario

La esterilización es un procedimiento común y, por lo general, de muy bajo riesgo. Es importante contactar a su veterinario si nota alguno de los siguientes síntomas en su mascota:

- Cambios en la zona quirúrgica (enrojecimiento, hinchazón, calor, hematomas excesivos, secreción).
- Abertura de la incisión o pérdida de suturas.
- Vómitos, diarrea/estreñimiento, pérdida de apetito.
- Esfuerzo para orinar, micción excesiva o sed. Tos o dificultad para respirar. Fiebre, letargo o hiperactividad.
- Vocalización u otros signos de dolor.
- Hinchazón abdominal.
- Palidez de las encías.