

Esterilización de Perros: Guía de Cuidados Posteriorres Para Dueños de Mascotas

Si bien la esterilización es una de las cirugías veterinarias más comunes, la recuperación requiere cuidados y supervisión posoperatoria. Utilice esta guía para comprender el proceso, cómo brindar la mejor atención posoperatoria y cuándo podría necesitar contactar a su veterinario.

¿Por qué Esterilizar a tu Perra?

Esterilizar a tu perra elimina futuros celos, reduciendo comportamientos como el deambular, el marcaje con orina, la inquietud y la agresividad hacia otros perros.

La esterilización también ayuda a prevenir riesgos graves para la salud, como la piómetra (una infección uterina potencialmente mortal), asociada con la sobre población de mascotas, al prevenir embarazos no deseados.

El Día Antes de la Cirugía...

Su veterinario le dará algunas instrucciones, que pueden incluir:

- No alimente a su perro después de la medianoche.
- Ofrézcale a su perro una pequeña cantidad de agua.

¿Qué Necesitaré?

Utilice esta lista de artículos y productos para facilitar la recuperación de su perro:

- Un cono de recuperación para evitar que se lama y muerda la zona quirúrgica.
- Una jaula, una cama suave para perros y mantas para proporcionar un lugar cómodo donde descansar.
- Analgésicos (suministrados por su veterinario).
- Juguetes para perros para mantener a su mascota estimulada durante la recuperación (juguetes interactivos como rompecabezas y KONGs de peluche funcionan bien).
- Calmantes, como suplementos como Nutramax, según lo recomendado por su veterinario.
- Comedores y bebederos.



Día de la Cirugía...

Esto es lo que puede esperar:

- Llegada al hospital temprano por la mañana y trámites a completar.
- Su perra será hospitalizada, se le extraerá sangre y se le colocará un catéter intravenoso (IV).
- Su veterinario realizará un examen exhaustivo, revisando el historial médico y los análisis de sangre de su perra, y creará un plan anestésico que sea el más adecuado para ella.
- Por favor, informe a su veterinario si cree que su mascota podría estar embarazada, ya que la cirugía podría tener que posponerse.
- A su perra se le administrarán analgésicos y sedantes para ayudar con la anestesia general que la mantendrá inconsciente y sin dolor durante la cirugía.
- Para mantener la operación lo más estéril posible, el veterinario afeitará a su perra en el lugar donde la operarán. ¡No se alarme!
- También se le colocará un tubo de respiración para ayudar a su mascota durante la cirugía.
- Se realiza una incisión en el centro del vientre, se ligan y extirpan los ovarios y el útero, y la incisión se cierra con suturas.



¿Qué Debo Esperar Cuando Mi Perro Llegue a Casa?

Debido a que su perro estuvo bajo anestesia, es posible que aún esté aturdido después de salir del hospital; esto debería desaparecer en 24 horas. Se recomienda no dejar a su perro sin supervisión durante 24 a 48 horas después de la cirugía. Su veterinario probablemente enviará a su perro a casa con medicamentos para reducir el dolor y la inflamación.

La primera noche en casa, ofrézcale a su perro:

- Un poco de agua (aproximadamente la mitad de su dosis habitual).
- Un poco de comida (aproximadamente un cuarto o la mitad de su dosis habitual).

Nota: Sea constante al limitar la comida de su perro después de su primera comida, ya que los cambios repentinos pueden provocar molestias gastrointestinales. Evite añadir suplementos a su comida u ofrecerle comida para humanos.

Administre a su perro todos los medicamentos recetados según las indicaciones de su veterinario.

Si cree que su perro tiene dolor, o si mastica o intenta lamer la incisión, comuníquese con su veterinario de inmediato. No le dé a su perro ningún analgésico para humanos ni de venta libre sin la aprobación de su veterinario.

Preguntas Frecuentes

petMD
by chewy

¿Cómo Puedo Ayudar a Mi Perro?

Asegúrese de seguir atentamente las instrucciones postoperatorias de su veterinario; es importante asegurarse de que su mascota sane por completo.

- Esto incluye: Dos semanas de ejercicio limitado: no salte, corra ni juegue bruscamente con otras personas. Evite cualquier actividad que pueda provocar que la incisión se abra, sangre, se infecte o se le formen moretones.
- Un lugar de descanso adecuado (un lugar al que esté acostumbrada), con ropa de cama cómoda. Una habitación pequeña cerrada con una puerta también puede mantener alejadas a otras mascotas durante la recuperación.
- Mantenga la zona quirúrgica seca; evite bañar a su perro durante este tiempo.

¿Cuánto Tiempo Tardará En Sanar Mi Perro?

Normalmente, el período de recuperación de una perra tras una esterilización es de 10 a 14 días. Es normal que aparezcan algunos moretones alrededor de la zona quirúrgica, pero si nota moretones excesivos o secreción de la incisión, consulte a su veterinario.

Su perra también podría tener un pequeño vendaje en la pata delantera, donde se colocó el catéter intravenoso. Este se puede retirar unas horas después de que regrese a casa. Vigile si presenta vómitos, diarrea, anorexia o letargo. Si tiene alguna duda, consulte a su veterinario.

¿Debo Limpiar la Zona Quirúrgica De Mi Perro?

Vigile la incisión de su perro al menos una vez al día y mantenga la zona seca.

Normalmente no es necesario limpiar la herida. No aplique ningún ungüento, aerosol ni pomada tópica sin consultar primero con su veterinario.

Los puntos externos rara vez se utilizan; sin embargo, si hay puntos, suelen retirarse en dos semanas.

Cuándo Llamar a Su Veterinario

La esterilización es un procedimiento común y, por lo general, de bajo riesgo. Es importante contactar a su veterinario si nota alguno de los siguientes síntomas en su mascota:

- Cambios en la zona quirúrgica (enrojecimiento, hinchazón, calor, hematomas excesivos, secreción).
- Abertura de la incisión o pérdida de suturas. Vómitos, diarrea/estreñimiento, pérdida de apetito.
- Sangrado, secreción o mal olor vaginal.
- Esfuerzo para orinar, micción excesiva o sed.
- Tos o dificultad para respirar.
- Fiebre, letargo o hiperactividad.
- Vocalización u otros signos de dolor.
- Hinchazón abdominal.
- Palidez de las encías.